

Bergroth 1901

en computa

Vient de paraître

CATALOGUE DES COLEOPTÈRES

DE LA

FAUNE GALLO-RHÉNANE

PAR AD. WARNIER.

Prix : France : 3.25 }
Etranger : 3.50 } franco

Envoi contre mandat adressé à M. F. MICHAUD, libraire-éditeur, 19, rue du Cadran-Saint-Pierre, ou à l'auteur : 8, rue des Templiers, à Reims.

D. A. PUTON.

CATALOGUE DES HÉMIPTÈRES (HÉTÉROPTÈRES, CIGADINES ET PSYLLIDES) DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE.

4^e Edition.

Edition ordinaire, franco..... 3 fr. 10
Id. sur une colonne, franco..... 5 fr. 20

Joindre un mandat-poste à la demande.

EN VENTE AU BUREAU DE LA Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM

EUROPÆ, CAUCASI & ARMENIÆ ROSSICÆ

AUCTORIBUS D^r L. v. HEYDEN, E. REITTER ET J. WEISE

Cette 4^e édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer, Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes, franco..... 12 fr. 75
Edition sur une colonne (catalogue-étiquettes ou memento) franco..... 19 25

Joindre un mandat-poste à la demande

REVUE

D'ENTOMOLOGIE

PUBLIÉE PAR LA

Société Française d'Entomologie

RÉDACTEUR : ALBERT FAUVEL

TOME XX. — 1901 — N° 11.

(12 numéros par an)

catalogued



CAEN

TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX
RUE SAINT-PIERRE, 102 & 116

1901

convexe, plus atténuée en avant et en arrière, bien distincte de toutes les espèces par son corselet et ses élytres mates, très alutacés, à ponctuation à peine visible, le 3^e article des antennes à peine d'un quart plus long que le 2^e, le corselet déprimé, d'aspect éburné-soyeux, fortement et presque régulièrement atténué de la base en avant, ce qui lui donne une forme trapézoïdale, son bord antérieur à striole marginale interrompue au milieu, à ponctuation bien moins dense que chez *bimaculata* L.; celle des élytres également bien moins serrée; stries plus fines, plus finement pointillées, interstries plans; une petite tache noire sur les 3^e, 4^e et 5^e interstries à partir de la suture, tantôt irrégulièrement découpée, le plus souvent réduite à deux petits traits noirâtres reliés en arrière par une très petite tache brune; cils des épipleures médiocres; dessous du corps assez brillant; prosternum brillant, marginé seulement entre les hanches antérieures, à ponctuation égale, assez dense. Couleur générale d'un roux testacé en dessus et en dessous. C. Tarses antérieurs médiocrement dilatés. — Long., 6-6 1/2 mill.

M. L. Puel m'a envoyé cette espèce de La Camargue, et M. le D^r Chobaut m'écrit: « elle est très commune aux Saintes-Maries-de-la-Mer et à Faraman (Camargue); on la trouve aussi à Palavas (Hérault). Elle ne vit que dans le sable très fin des dunes, tandis que la *bimaculata* L. et ses variétés ne se prend que là où le sable est grossier, rempli de petits graviers (comme les bords de l'étang de Thau à Cette, les plages de Collioure et de Banyuls-sur-Mer). »

J'en ai vu des exemplaires étiquetés: Le Lavandou (Var) dans la collection Ch. Brisout, et, d'après la courte diagnose de Rey (*Rev. d'Ent.*, 1891, 85), il est à croire que les exemplaires d'Aigues-Mortes qu'il rapporte à son *acuminata*, ne sont que des *provincialis*. La vraie *acuminata* Küst. (*oblonga* Baudi) ne paraît pas française et comprend les quatre variétés (*limbata* Baudi, *incerta*, *submaculata* Rey, *maculosa* Seidl.) indiquées par Seidlitz (*Nat.*, V, 481).

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS AU *Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique par le docteur A. Puton*, 4^e éd.

Par E. BERGROTH.

P. 7. La plus systématique du genre *Melanodema* Jak. est près du genre *Odontotarsus* Lap.

- ✓ P. 8. Adde: *Sternodontus binodulus* Jak. 1893. R. m.
✓ P. 15. Le genre *Neostrachia* Saund. ne peut pas être réuni au genre *Apines* Dall., qui a la base du ventre inerme. Contrairement à l'avis de M. Breddin, il me paraît impossible de détacher *Neostrachia* du genre *Menida* Motsch.
P. 39. Adde: *Acalypta sordida* Jak. Sib.
P. 41. *Phyllotochila ciliata* Fieb. doit reprendre le nom antérieur de *reticulata* H.-Sch. qui n'est pas préoccupé dans le genre.
Catoplatus Horvathi Put. doit reprendre son premier nom *flavipes* Horv. *Monanthia flavipes* Sign., dont j'ai vu le type, est une vraie *Monanthia*.
P. 51. Au lieu de *Nabis Camerani* Noelli, il faut lire *Camerani*.
P. 53. *Cryptostemma* H.-Sch., préoccupé (Arachnides, Coléoptères) doit être nommé *Dipsocoris* Hal.
P. 54. *Tetraphleps vittata* Fieb. doit prendre le nom antérieur de *bicuspis* H.-Sch. La première diagnose de Herrich-Schäffer a paru déjà dans son *Nomencl. ent.*, I, p. 60 (1835).
P. 56. *Fulvius brevicornis* Reut. est à rayer du catalogue. De cet insecte j'ai vu des exemplaires provenant du Venezuela. *F. oxycarenoides* Reut. doit prendre le nom antérieur de *punctum-album* Rossi, placé par Puton parmi les *species incertae sedis*.
P. 69. Adde: *Globiceps gracilis* Jak. 1893. Sib.
P. 70. Adde: *Orthotylus salicis* Jak. 1893. Sib.
O. propinquus Reut. est, selon M. Saunders, synonyme de *O. ochrotrichus* Scott.
P. 74. Selon les principes de nomenclature adoptés dans le catalogue, *Brachyarthrum limitatum* Fieb. doit prendre le nom plus ancien *nigriceps* Boh. Boheman l'a décrit comme nouvelle espèce sans citer le *nigriceps* Fall.
P. 77. Adde: *Plagiognathus fasciatus* Jak. 1893. Sib.
Adde: *Campylomma albicans* Jak. 1893. Sib.
P. 109. Adde: *Delphax Stejnegeri* Ashm. 1899. Sib. or.